

QUÉ ESPERAR DE LA CIRUGÍA DE PÁRPADOS

Casi toda la cirugía de párpados se realiza como un procedimiento ambulatorio. Se usará anestesia local para adormecer su ojo y el área que lo rodea.

Antes de la cirugía, su oftalmólogo realizará un examen completo de la vista y hablará con usted sobre las opciones de tratamiento. Él o ella también pueden tomar fotos de sus ojos y evaluar su visión lateral.

CONSEJOS PARA LA CIRUGÍA DE PÁRPADOS

Antes de la cirugía de párpados, asegúrese de informarle a su oftalmólogo sobre todos los medicamentos que toma. Incluya todos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos. Es importante que su cirujano visual sepa si toma aspirina (o medicamentos que contienen aspirina) o anticoagulantes, o si tiene un problema de sangrado.


Al igual que con cualquier tipo de cirugía, existen posibles riesgos y complicaciones con la cirugía de párpados. Su oftalmólogo discutirá esto con usted.

RESUMEN

Los problemas de párpados pueden incluir párpados caídos, piel de párpado adicional o párpados que giran hacia adentro o hacia afuera. Todos estos problemas pueden limitar la visión, ser incómodo y afectar la apariencia. La cirugía de párpados puede mejorar su visión, comodidad y apariencia.

Si tiene alguna pregunta sobre sus ojos o su visión, hable con su oftalmólogo. Él o ella está comprometido a proteger su vista.

Cirugía de Párpados



Arecibo
787.878.2758 / 2744
Ave. José de Diego 404
Arecibo, PR

Manatí
787.884.4001 / 4002
Manatí Medical Center
Professional Plaza Oficina 607

Centro de Cirugía Ambulatoria
787.816.5641

www.oftalmologicodearecibo.com | www.oftalmologicodeamanati.com

CIRUGÍA DE PÁRPADO

Tener un problema de párpado puede ser doloroso, limitar su visión y afectar su apariencia. Muchas personas tienen problemas de párpados. Pueden incluir párpados superiores caídos, piel del párpado adicional o párpados que se vuelven hacia adentro o hacia afuera. Afortunadamente, los oftalmólogos pueden tratar muchos tipos de problemas de párpados con cirugía.

CORRECCIÓN DE PTOSIS

La ptosis ocurre cuando uno o ambos párpados superiores se caen. Puede limitar su visión periférica (lateral) o central (hacia adelante). Si tiene ptosis en un solo ojo, su cara puede verse desigual. Si ambos párpados se caen, puede parecer cansado.

Alguien puede nacer con ptosis. En este caso, un niño puede levantar las cejas o inclinar la cabeza hacia atrás para poder ver. La ptosis puede limitar seriamente el desarrollo de la visión aguda. Cuando los párpados de un niño están caídos o tienen una forma incorrecta, por lo general, ambos ojos no se enfocan de manera uniforme. Él o ella puede necesitar anteojos para ver claramente.

Después de un examen ocular completo, el oftalmólogo del niño puede recomendarle una cirugía para arreglar el párpado. Esta cirugía generalmente se realiza durante los años preescolares (edades 3-5).

La ptosis también puede desarrollarse más tarde en la vida adulta. A veces comienza después de tener otros tipos de cirugía ocular o hinchazón de los párpados.

Con la cirugía de ptosis, el músculo del párpado acortándolo. Esto ayuda a levantar la tapa caída, mejorando la visión y la apariencia del ojo.



Con ptosis, el párpado superior se cae.



Con la cirugía de ptosis, el párpado superior vuelve a su posición normal.

BLEFAROPLASTIA PARA ELIMINAR EL EXCESO PIEL DEL PÁRPADO

La piel de su párpado es muy delgada y tiende a extenderse con el tiempo. A veces se estira demasiado, causando exceso de piel del párpado. Cuando esto le sucede al párpado superior, puede limitar su visión lateral. Cuando la piel del párpado inferior se estira, es posible que tenga lo que algunas personas llaman "bolsas" debajo de los ojos. El oftalmólogo puede remover el exceso de piel del párpado en un procedimiento llamado blefaroplastia. Al mismo tiempo, el cirujano también puede eliminar tejido adiposo adicional cerca del párpado o tensar músculos y tejido. Esta cirugía ayuda a que el área alrededor del ojo y el párpado se vean más claramente definidos. También hace que los ojos parezcan menos cansados y más alerta.



Demasiada piel del párpado puede sentirse pesada y limitar la visión



La blefaroplastia elimina el exceso de piel del párpado, mejorando la apariencia y la visión


REPARACIÓN DE ECTROPION / ENTROPIÓN

Cuando el párpado inferior desciende y gira hacia afuera, se llama ectropión. Esto puede suceder debido a la edad, la enfermedad de la piel o una quemadura en el párpado. Ectropion puede hacer que sus ojos se sequen, sean acuosos y sensibles a la luz y al viento.

Si el párpado inferior gira hacia el globo ocular, se llama entropión. Esta condición puede desarrollarse debido a la edad, infección o cicatrización dentro del párpado. Cuando el párpado gira hacia adentro, las pestañas y la piel pueden frotarse contra el ojo. Esto puede hacer que tu ojo se ponga rojo, acuoso y muy irritado. Si no se trata, el entropión también puede provocar una infección en la córnea (la superficie clara del ojo).

La cirugía para ectropión y entropión devuelve el párpado a su posición normal. Esto ayuda a reducir los síntomas dolorosos e irritantes y protege su ojo.


Párpado Normal



Ectropion



Entropion



En estos dibujos, el párpado se corta para mostrar la apariencia del párpado normal (arriba) y el párpado que gira hacia afuera (medio) y hacia adentro (abajo).