

Después de un buen historial médico y un examen oftálmico que incluye ver el fondo del ojo y posiblemente algunas pruebas de laboratorios se podría llegar a determinar la causa de la inflamación. Así se puede comenzar tratamiento adecuado ó referir al paciente a un subespecialista (un oftalmólogo con estudios adicionales sobre la condición).




Visite a un oftalmólogo y conserve su visión.

El oftalmólogo es la persona especializada en oftalmología, adiestrada profesionalmente y autorizada legalmente a ofrecer el cuidado total de los ojos.



Uveitis



Arecibo
787.878.2758 / 2744
Ave. José de Diego 404
Arecibo, PR

Manatí
787.884.4001 / 4002
Manatí Medical Center
Professional Plaza Oficina 607

Centro de Cirugía Ambulatoria
787.816.5641

Uveitis


La Uveitis es una inflamación del tracto uveal. El tracto uveal es la parte vascular del ojo que suple la mayor parte del flujo sanguíneo a otras estructuras dentro del ojo. Está compuesto por el iris, el cuerpo ciliar y la coroide.

Uveitis significa la inflamación de una o más de estas estructuras, pero frecuentemente afecta también tejidos adyacentes a la uvea como son el vitreo, la retina y la esclera.



Clasificación

La uveitis generalmente se clasifica como: anterior, intermedia o posterior, dependiendo de la localización anatómica de las estructuras afectadas dentro del ojo. En la uveitis anterior se afecta el iris y el cuerpo ciliar, en la uveitis intermedia se afecta el vitreo y en la uveitis posterior se afectan las estructuras posteriores del ojo como son la coroide y la retina.



Signos y Síntomas

Los signos y síntomas clásicos de la uveitis anterior son el dolor, el ojo rojo y la fotofobia (sensibilidad a la luz). Estos primeros signos y síntomas pueden ser leves o severos y pueden desarrollarse lenta o rápidamente.

Uveitis intermedia (o del vitreo) se presenta con flotadores (partículas flotantes en el vitreo) y visión borrosa.

Uveitis posterior (retina y uveo) usualmente se presenta con pérdida de visión. Sólo el oftalmólogo puede identificar otros signos que ayudarán a establecer el diagnóstico.

Causas

Las causas de uveitis son muchas y varían por edad, sexo y región geográfica. Algunas causas son infecciosas como sífilis, tuberculosis, toxoplasmosis y herpes. Algunos tipos de uveitis están asociados a enfermedades sistémicas como artritis reumatoidea, lupus y sarcoidosis. Otras uveitis se limitan o afectan solamente uno o ambos ojos. A pesar de que es una de las condiciones más estudiadas en el campo de la oftalmología, todavía no sabemos cuál es la causa de muchas uveitis.

Diagnóstico y Tratamiento

La uveitis es una causa significativa de pérdida de visión en todas las edades incluyendo niños y adultos en edad productiva. Para diagnosticar y tratar adecuadamente esta condición es esencial que el paciente sea evaluado por un oftalmólogo.

